

Las Respuestas de QUIÉN, QUÉ, Y PORQUÉ de la Prueba de Detección de Audición en Recién Nacidos

¿QUIÉN?

Su bebé, y cada uno de los bebés nacidos en Indiana, deben recibir la prueba temprana de pérdida de audición, ANTES que su bebé deje el hospital. Si su niño no nació en un hospital, llame al hospital más cercano para pedir una cita médica, para efectuar la prueba de detección temprana de la audición, antes de que su hijo tenga 1 mes. Si el hospital no puede completar la prueba, contacte al Programa de Detección Auditiva e Intervención Temprana (The Early Hearing Detection & Intervention (EHDI) Program) llamando al teléfono 888-815-0006. Las personas que tienen deficiencia auditiva o que son sordos pueden llamar al 711 que es el teléfono Relay de asistencia y ayuda de operadora en Indiana.

¿SU BEBÉ YA RECIBIÓ LA PRUEBA DE DETECCIÓN AUDITIVA?

¿QUÉ?

Una prueba de detección temprana de la audición sirve para ver y constatar si la audición de su bebé es normal, o si necesita de exámenes y estudios adicionales. La prueba es rápida, fácil, y puede ser efectuada mientras su niño duerme o descansa tranquilamente. Existen dos tipos de prueba de audición: EOA-Emissiones Otoacústicas (OAE en inglés) y PEATC/BERA-Potenciales Evocados Auditivos de Tallo/Tronco Cerebral (ABR en inglés). Ambos exámenes son seguros y no hacen daño o lastiman a su bebé.

- La prueba de EOA se efectúa colocando un pequeño micrófono en cada uno de los oídos de su bebé, para después ver la respuesta de cada oído a la emisión de los sonidos.
- El examen de PEATC/BERA se realiza colocando tres electrodos en la cabeza de su bebé para estudiar la reacción del cerebro a los sonidos emitidos en los oídos de su niño.

¿PORQUÉ?

Si no se detecta temprano, la pérdida de audición puede atrasar el desarrollo normal del habla y el lenguaje de su bebé. Aproximadamente cada 48 horas nace un bebé en Indiana con pérdida auditiva. La pérdida de la audición no se ve. Su hijo no puede saber si no está escuchando su voz y otros sonidos importantes.

Si existe una pérdida de audición, existe esperanza y ayuda disponible. Los estudios indican que los niños que nacen con pérdida auditiva, la cual fue detectada temprano, tienen una buena probabilidad de aprender el habla y el lenguaje como los niños normales.

¿Desea hacer preguntas?

Por favor comuníquese con el Programa de Detección Auditiva e Intervención Temprana (The Early Hearing Detection & Intervention (EHDI) Program) llamando al teléfono 888-815-0006 o en la página de Internet www.hearing.in.gov

Nosotros podemos responder a sus preguntas sobre el sentido de la audición de su bebé. Las personas que tienen deficiencia auditiva o que son sordos pueden llamar al 711 que es el teléfono Relay de asistencia TDD y ayuda de operadora en Indiana.

Su médico u hospital pueden ayudarlo. El pediatra de su hijo u otro profesional es el que le ayuda a mantener la salud de su bebé, y supervisa las necesidades médicas del mismo.

Si tiene preguntas o preocupaciones sobre su niño/a, por favor comuníquese con:

La Línea de Ayuda para Familias en Indiana
(Indiana Family Helpline), al teléfono 800-433-0746 (en español) o entre a la página de Internet <http://www.in.gov/isdh/21047.htm>

RESULTADOS DE LA PRUEBA DE AUDICIÓN

Examen Auditivo

Programa de Detección Auditiva e Intervención Temprana

Su bebé, _____, Nacido _____,
(Nombre) (Fecha de nacimiento)

Recibió la prueba de audición en el día: _____ En el/la
(Fecha)

(Hospital/Clínica)

Oído Derecho:	Superó	Referido	Pasó con Factor de Riesgo*
Oído Izquierdo:	Superó	Referido	Pasó con Factor de Riesgo*

*El factor de riesgo de su bebé es: _____

- Superó (Aprobó) –Su niño/a posiblemente tiene audición normal.
- Referido- Su bebé debe recibir lo antes posible, una evaluación audiométrica adicional, efectuada por un audiólogo.
- Pasó con factor de riesgo- Su niño/a debe recibir exámenes de continuidad, efectuados por un audiólogo cuando él/ella tenga entre 9 a 12 meses de edad.

*FACTORES DE RIESGO QUE PUEDEN LLEVAR A LA PÉRDIDA DE AUDICIÓN EN LA INFANCIA

Algunos niños que pasaron o superaron la prueba de detección auditiva temprana de recién nacidos, pueden tener factores de riesgo que podrían conducir a la pérdida de la audición durante los primeros años de vida. Algunos de los factores de riesgo incluyen:

- Una historia familiar de niños con pérdida auditiva
- Su bebé estuvo expuesto a ciertas infecciones antes del nacimiento
- Su niño precisó de un procedimiento especial para tratar la Ictericia (cuando la piel se vuelve de color amarillo, causado por una alta concentración de bilirrubina, la cual es una proteína normalmente producida por el cuerpo).
- Su niño tiene la cabeza, rostro, u oídos con forma diferente.
- Su niño tiene una condición neurológica (que envuelve al cerebro) que está asociada con la pérdida de audición.
- Su niño tuvo meningitis (una infección que afecta al cerebro y la espina o columna vertebral).
- Su niño tuvo un trauma cerebral que precisó de admisión al hospital.
- Su bebé tomó ciertos medicamentos llamados ototóxicos (que pueden herir o debilitar el sentido de la audición) como por ejemplo, quimioterapia para tratamiento del cáncer.
- Su niño estuvo en la Unidad Neonatal de Tratamiento Intensivo (UTIN) por cinco o más días después del nacimiento.

Si usted desea formular preguntas sobre cualquiera de los factores de riesgo mencionados arriba, o está preocupado sobre la capacidad auditiva de su niño, hable con el médico de su bebé o comuníquese con el Programa de Detección Auditiva e Intervención Temprana (EHDI, en inglés).



Indiana State
Department of Health

The Early
Hearing Detection
& Intervention
Program