Indiana State Department of Health
Epidemiology Resource Center

Información breve: Enfermedad neumocócica invasiva

¿Qué es la enfermedad neumocócica invasiva?

La bacteria*Streptococcus pneumoniae* causa muchos tipos de infecciones, como por ejemplo en los oídos y los senos. Es la causa más común de infecciones pulmonares (neumonía). Cuando la bacteria causa cualquier tipo de infección, se denomina enfermedad neumocócica. La bacteria puede infectar heridas, se puede inhalar e ingresa en áreas normalmente estériles del organismo en las que no se deberían encontrar bacterias, como la sangre o el líquido que rodea el cerebro y la médula espinal. Cuando las bacterias ingresan a estas áreas estériles, se puede desarrollar una infección grave que pone en riesgo la vida ("enfermedad invasiva"). Aproximadamente 600-700 casos de infección neumocócica invasiva ocurren cada año en el estado de Indiana.

¿Cuáles son los síntomas de la enfermedad neumocócica invasiva?

Los síntomas de la enfermedad neumocócica invasiva dependerán del foco infeccioso. La neumonía, la bacteremia (enfermedad causada por bacterias en la sangre) y la meningitis (inflamación del recubrimiento del cerebro) son todas las consecuencias posibles de la enfermedad neumocócica invasiva. Estas enfermedades pueden presentar cualquiera de la amplia variedad de síntomas, entre estos: fiebre, escalofríos, rigidez muscular, dolor de cabeza, insuficiencia respiratoria, dolor en el pecho, vómitos, convulsiones o cansancio.

¿Cómo se propaga la enfermedad neumocócica invasiva?

La bacteria se propaga por el contacto con gotas de la nariz o garganta de una persona infectada. Esto puede suceder cuando una persona infectada tose o estornuda. Las personas saludables también pueden portar la bacteria.

¿Quién está en riesgo de contraer la enfermedad neumocócica invasiva?

La enfermedad es más común en niños menores de dos años, niños que asisten a centros de cuidado infantil, las personas mayores o los inmunodeprimidos, los fumadores y las personas con ciertas enfermedades (como el VIH o anemia falciforme). La vacuna puede disminuir el riesgo de infección.

¿Cómo sé si tengo la enfermedad neumocócica invasiva?

Los síntomas de la enfermedad neumocócica invasiva dependerán del foco infeccioso.

Los síntomas son:

- escalofríos
- fiebre alta
- dolor de cabeza intenso
- tortícolis
- dolor en el pecho
- tos
- presión en el oído y dolor en los senos

Si piensa que podría tener una infección o si estuvo expuesto a alguien con la enfermedad y tiene estos síntomas, consulte de inmediato con el médico. Tal vez el médico solicite un análisis de sangre o de otros lugares de la infección para comprobar si está presente la bacteria.

Cómo se puede tratar la enfermedad neumocócica invasiva?

La enfermedad neumocócica invasiva se puede tratar con antibióticos. El tratamiento temprano puede reducir el riesgo de muerte a causa de la enfermedad. Tal vez se necesite la hospitalización para los que sufren una infección grave.

¿Cómo se previene la enfermedad neumocócica invasiva?

Existen dos vacunas que protegen contra la mayoría de las clases de esta enfermedad. Una vacuna (Prevnar 13®) es para niños desde los 2 meses hasta los 5 años y ahora se incorporó como vacuna infantil de rutina. También se puede dar a los adultos de 19 años o más con ciertos problemas médicos que no se vacunaron previamente contra esta enfermedad. Otra vacuna (Pneumovax®) es para personas mayores de 65 años y ciertas personas inmunodeprimidas. Todas las personas mayores de 65 años y ancianos deberían darse esta vacuna.

Toda la información presentada tiene como fin el uso público. Si desea más información sobre la enfermedad neumocócica invasiva, puede encontrarla en:

- http://www.cdc.gov/vaccines/vpd-vac/pneumo/vacc-in-short.htm
- http://www.cdc.gov/vaccines/hcp/acip-recs/vacc-specific/pneumo.html
  http://www.cdc.gov/pneumococcal/about/index.html

Estos sitios están disponibles solamente en inglés.